

Diarrea y nematodos en perro Pastor Alemán

Inicio de la conversación 02/09/2026 10:06
Último mensaje 02/09/2026 10:07
Fecha del informe 02/09/2026 08:07

Datos del animal

Nombre	Luna
Especie	Perro
Raza	Pastor Alemán
Sexo	Hembra
Fecha de nacimiento	06/01/2022
Edad	4 años y 7 meses
Peso	28 kg

Contexto del paciente

Especie: Perro Raza: Pastor Alemán Sexo: hembra Fecha de nacimiento: 2022-01-06 Edad (a fecha de hoy): 4 años y 7 meses Peso: 28.0 kg

Resumen del caso

Luna, una perra Pastor Alemán de 4 años y 7 meses, presenta diarrea asociada a una infestación por nematodos gastrointestinales, confirmada mediante análisis de heces. La carga parasitaria es moderada a alta. El análisis de sangre muestra un proceso inflamatorio con eosinofilia y anemia leve.

Antecedentes

Sin antecedentes registrados.

Hechos confirmados

- Diarrea asociada a infestación por nematodos gastrointestinales (Síntoma)
- Carga parasitaria moderada a alta en análisis de heces (Exploración)
- Proceso inflamatorio con eosinofilia en análisis de sangre (Hematología)
- Anemia leve observada en análisis de sangre (Hematología)

Tratamientos confirmados

Sin tratamientos confirmados.

Posibles hipótesis

Infestación por nematodos gastrointestinales **ALTO** **DIAGNÓSTICO PRINCIPAL**

A FAVOR

- Carga parasitaria moderada a alta en análisis de heces (Fuerte)
- Eosinofilia en análisis de sangre (Moderada)

INCERTIDUMBRES

- No se especifica el método de detección ni identificación a nivel de género/especie.

Valoración

Luna presenta un cuadro clínico de diarrea debido a una infestación por nematodos gastrointestinales, respaldado por hallazgos de laboratorio que incluyen una carga parasitaria moderada a alta y eosinofilia. La anemia leve podría estar relacionada con la infestación, aunque no se ha confirmado la regeneración debido a la falta de recuento de reticulocitos.

Pruebas complementarias posibles

- Recuento de reticulocitos para evaluar la regeneración de la anemia.

Conclusión del caso

La infestación por nematodos es la hipótesis mejor sustentada, con evidencia de laboratorio que respalda esta condición. La anemia leve y el proceso inflamatorio son consistentes con la infestación, aunque la falta de identificación específica de los nematodos limita la certeza diagnóstica.

Limitaciones

- Falta de identificación específica de los nematodos en el análisis de heces.

Tratamiento o plan terapéutico

1. fenbendazol — 50 mg/kg VO — PANACUR 500 mg COMPRIMIDOS PARA PERROS 500 mg/tableta

Seguimiento

- Reevaluar la respuesta al tratamiento antiparasitario en 7 días.
- Monitorear signos de anemia y diarrea persistente.

Notas

- La identificación específica de los nematodos no se ha realizado, lo que podría influir en el tratamiento específico.

Informe de demo - Artemisia - Remvetia

Análisis de los archivos adjuntos por expertos

Resultados del Experto en coprología y parasitología fecal:

Análisis de heces

IMPRESIÓN GLOBAL

Coprología compatible con parasitosis por nematodos gastrointestinales (carga moderada-alta) y signos de maldigestión; sangre oculta negativa.

INTERPRETACIÓN / RESUMEN

Muestra fecal con consistencia blanda, color marrón claro, pH 6.8, moco escaso y test de sangre oculta negativo. Parasitología: huevos de nematodos gastrointestinales presentes con carga parasitaria estimada moderada-alta; no se especifica el método de detección ni se informa identificación a nivel de género/especie ni recuento (EPG). Protozoos: no observados en la preparación reportada. Digestibilidad/flora: restos alimentarios moderados (sugieren maldigestión) y levaduras escasas, sin evidencia de sobrecrecimiento. Conjunto de hallazgos que respalda infestación por nematodos con carga relevante, concordante con el cuadro clínico de diarrea, sin indicios de hemorragia digestiva en el test de sangre oculta.

HALLAZGOS ANORMALES

- Huevos de nematodos gastrointestinales presentes (carga estimada moderada-alta) (Grave)
- Heces blandas (Moderada)
- Maldigestión (restos alimentarios moderados) (Moderada)

LIMITACIONES

- Método coprológico no especificado (p. ej., flotación, concentración, frotis, test de antígeno).
- No se aporta identificación de los nematodos a nivel de género/especie.
- Sin cuantificación objetiva (EPG o escala estandarizada); solo 'carga parasitaria estimada moderada-alta'.
- Fecha de la prueba no indicada; discordancia de edad (informe: '3 años' vs. paciente: 4 años y 7 meses a la fecha de referencia), posible error de OCR o muestra previa.
- Número de muestras no indicado (una sola muestra reduce sensibilidad para protozoos).

CONFIANZA

86%

Resultados del Experto en hematología clínica:

Análisis de Sangre

IMPRESIÓN GLOBAL

Leucocitosis con eosinofilia y linfocitosis leves, junto con anemia normocítica normocrómica leve; plaquetas conservadas.

INTERPRETACIÓN / RESUMEN

El hemograma muestra leucocitos 18,900/ μ L (rango no figura) $\rightarrow$ compatible con leucocitosis leve. En el diferencial: eosinófilos 1,900/ μ L (rango no figura) $\rightarrow$ eosinofilia; linfocitos 4,700/ μ L (rango no figura) $\rightarrow$ linfocitosis leve; neutrófilos 11,500/ μ L (rango no figura) $\rightarrow$ en el límite alto para perro adulto en muchos laboratorios, sin evidencia adicional de desviación a la izquierda en el texto. La serie roja presenta hematíes 5.4 M/ μ L, hemoglobina 11.1 g/dL y hematocrito 34% (rangos no figuran) $\rightarrow$ anemia leve; índices VCM 63 fL y CHCM 32.6 g/dL (rangos no figuran) $\rightarrow$ patrón normocítico normocrómico; la regeneración no es valorable sin recuento de reticulocitos. Plaquetas 310,000/ μ L (rango no figura) $\rightarrow$ recuento plaquetario adecuado. Proteínas totales 5.6 g/dL (rango no figura) $\rightarrow$ en el límite bajo-normal esperado para caninos en muchos laboratorios, sin poder confirmar hipoproteinemia. El patrón global sugiere un proceso inflamatorio con componente eosinofílico, en concordancia con el contexto gastrointestinal referido, sin establecer etiología.

HALLAZGOS ANORMALES

- leucocitosis (Leve)
- eosinofilia (Moderada)
- linfocitosis (Leve)
- anemia normocítica normocrómica (Leve)

LIMITACIONES

- Rangos de referencia no figuran en el informe, por lo que la graduación de severidad se basa en valores caninos habituales.
- No se reportan reticulocitos ni revisión de frotis; no puede confirmarse regeneración ni alteraciones morfológicas.
- Informe parcial: se dispone de hemograma y proteínas totales, sin bioquímica sérica complementaria.
- Texto extraído por OCR: aunque legible, siempre existe posibilidad de errores menores.

CONFIANZA

90%

Archivos utilizados

Título	Categoría	Nombre original
Análisis de heces	Análisis de heces	ANÁLISIS COPROLÓGICO LUNA.pdf
Análisis de Sangre	Análisis de sangre	Análisis_De_Sangre_Luna.pdf